



SEXY EYES?

DIE AUGEN sind die Geheimwaffe des Mannes. Doch was tun, wenn Schlupflider und Tränensäcke stören? Dr. Daniela Hoch gibt Antworten.

VORHER



NACHHER



Viele Männer leiden unter starken Tränensäcken und Schlupflidern, die durch ein Erschlaffen des Bindegewebes entstehen. Dr. Daniela Hoch kann helfen.

Schlupflider und Tränensäcke lassen das Gesicht alt und müde wirken.

TOP-ÄRZTIN DANIELA HOCH

DR. DANIELA HOCH PLASTISCH- ÄSTHETISCHE CHIRURGIN

Dr. Daniela Hoch zählt zu Österreichs renommiertesten Fachärztinnen für Plastisch-Ästhetische Chirurgie. Die Medizinerin bietet in ihrer Ordination in der Privatklinik Währing u. a. Beratung zum Thema Ober- und Unterlidkorrekturen. Auch viele andere plastisch-ästhetische Korrekturen zählen zu Dr. Daniela Hochs Fachgebieten.

KONTAKT

Dr. Daniela Hoch
Privatklinik Wien Währing
Kreuzgasse 17-19, A-1180 Wien
Tel.: 01/261 66-380
hoch@danielahoch.com
<http://danielahoch.com>

Augen sagen mehr als tausend Worte! Nicht umsonst gelten sie als wichtigste Partie des Gesichts. Doch leider verändern sich mit dem Alter auch die Augenlider – durch Erschlaffen des Bindegewebes entsteht ein Hautüberschuss. Das überhängende Lid kann auf die Wimpern drücken oder in ausgeprägteren Fällen sogar das Gesichtsfeld einschränken. Die sogenannten Schlupflider lassen den Gesichtsausdruck oft müde und traurig erscheinen, ebenso wie Tränensäcke. Korrekturoperationen der Ober- und Unterlider schaffen schnell und effektiv Abhilfe. „Mit diesem Eingriff können wir nicht nur eine ästhetische, sondern auch eine funktionelle Verbesserung herbeiführen“, erklärt Top-Chirurgin Dr. Daniela Hoch.

WIE FUNKTIONIERT DIE OPERATION?
Nachdem der Hautüberschuss angezeichnet wurde, erfolgt der Schnitt in der natürlichen Hautfalte des Oberlides, geht seitlich in die Lachfalten über und ist somit nach vollständiger Wundheilung kaum mehr sichtbar. Liegt lediglich eine Erschlaffung der Haut und des Muskels vor, ist die Entfernung dieser

überschüssigen Haut gemeinsam mit einem schmalen Muskelstreifen ausreichend. Sollte darüber hinaus eine Schwellung der Oberlider vorliegen, kann zusätzlich die Entfernung des hervorstehenden Fettgewebes notwendig sein. Bei tiefliegenden Augenbrauen kann eine Korrektur der Oberlider mit einer Hebung der Augenbrauen kombiniert werden. Die Korrektur der Unterlider ist sehr vielfältig. „Es wichtig, zu erkennen, ob nur ein Hautüberschuss, ein Überschuss an Fettgewebe oder eine Kombination aus beidem besteht“, so Dr. Hoch, die darauf hinweist, dass auch „die Elastizität des Unterlides beurteilt werden muss, um eine eventuelle Straffung mittels Muskelstreifen durchzuführen“.

WIE LANGE MUSS ICH IM SPITAL BLEIBEN?

Die Korrektur der Ober- und Unterlider kann im Rahmen einer OP ambulant im Dämmer Schlaf durchgeführt werden. Dr. Daniela Hoch führt den Eingriff in der Privatklinik Wien Währing durch, wo der Patient nach der OP die Möglichkeit hat, noch einige Stunden zu ruhen.

NACH DER OPERATION

„In den ersten Tagen kann es zu einer Schwellung, sowie zum Auftreten von Blutergüssen kommen“, ergänzt Dr. Hoch, die das Auflegen von Coolpacks, körperliche Schonung und das Liegen auf dem Rücken mit leicht erhöhtem Oberkörper empfiehlt. Die Nahtentfernung erfolgt fünf bis sieben Tage postoperativ, gesellschaftsfähig ist man rund 10 bis 14 Tage nach der Operation wieder.

UND DIE KOSTEN?

Die Korrektur von Ober- und Unterlidern kostet ab 3.800 Euro. Bei medizinischer Indikation kann eine Kostenübernahme der Oberlidkorrektur durch der Krankenkasse erfolgen.